

(Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний
/ Корейская Медицинская Ассоциация)

Для безопасного проведения
вакцинации от COVID-19

Памятка о возможных побочных реакциях организма после вакцинации

Обязательно запомните!




 KOREA VOLUNTEER CENTER
(재)한국중앙자원봉사센터

 행정안전부

 bbb korea
bbb 비비비코리아

После прививки от COVID-19 соблюдайте следующее:



При отеке и болях в месте укола накройте эту область сухой чистой тканью и поверх неё приложите холодный компресс.



При незначительном повышении температуры пейте больше жидкости и отдыхайте.




При повышении температуры и боли в мышцах принимайте жаропонидающие препараты или обезболивающие средства.

* Перед вакцинацией заранее подготовьте жаропонижающие препараты или обезболивающие средства, содержащие парацетамол, принимайте их при болях в теле после вакцинации.

Следует обратиться к врачу в следующих случаях:

После вакцинации

- если после вакцинации отёк, боль или покраснение в области инъекции не проходят даже по прошествии 48 часов;
- если в течение 4 недель после вакцинации наблюдаются такие симптомы, как одышка, боль в груди, непрекращающаяся боль в животе и отёк ног;
- если после вакцинации головная боль продолжается больше 2 суток и обезболивающие препараты не помогают или возникает затуманивание зрения;
- если после вакцинации наблюдается упадок энергии или появились другие симптомы;
- если после вакцинации появились синяки или кровотечение не в области инъекции;



Следует позвонить по телефону «119» или обратиться в пункт неотложной помощи в следующих случаях:

- если после вакцинации возникли проблемы с дыханием или появилось головокружение;
- если после вакцинации появились отёки на губах и лице или сыпь на теле;
- если после вакцинации Вы внезапно потеряли сознание или упали в обморок;

