


អ្នកកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រ ការពារជំងឺកញ្ចប់ជំងឺលឿនបង្កការជាមុន!



នាគីជាជំងឺចូលដល់កាយរយៈដំណាក់ទឹក និងខ្យល់ដូចជាការ ក្អកក្អាយក្អាត ហើយកូនរូបមានកំណត់លក្ខណៈ ដោយការចម្រុះ មរោគខុៗគ្នា។

* ការចម្រុះមរោគជាង៩០%ចំពោះអ្នកដែលមានភាពស៊ាំមិនគ្រប់គ្រាន់ ចំពោះជំងឺកញ្ចុះរីលកូនរូបមានចូលដល់ពេញកាយពេញខ្លួន។

+ នាគសញ្ញាចម្រុះនៃជំងឺកញ្ចុះរីល +

(រយៈពេលសម្រាប់កូនរូបខ្លួន៧-២១ថ្ងៃ)

ដំណាក់កាលនៃបឋម



ដំណាក់កាលកន្ទួលលេចឡើង



ដំណាក់កាលជាសះស្បើយ



មានកូនរូបក្អក ក្អាយ ក្អាត ហ្វឹក ហ្វឺត



កន្ទួលកូនរូបលេចឡើងនៅជុំវិញ




ពេញខ្លួនកន្ទួលហាក់ ហើយបន្តសល់

ចំនួនករណីអុនកក់ដំបើកញ្ជុជុរីលកំពុងកើនឡើង* នៅទូទាំងពិភពលោក
 ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការជុរីដំណើរនាសក្រានបុរេសង្គម
 ជាលទ្ធផល អុនកក់ដំបើកញ្ជុជុរីលកំពុងកើនឡើង។

+ ការចែកចាយតាមតំបន់ស្របចុះឡើងនៃអុនកក់ដំបើកញ្ជុជុរីល +

ការជុរីដំណើរជាបណ្តាញ និងបន្តការនាតកុហក នៅអឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូព៌ា និង
 អាស៊ីអាគ្នេយ៍





មុនចុះដំណើរការកំសានុក

- ✓ កូនបុរាគមហុនកហានទទួលបានបង្កការជំងឺកញ្ញាជុនីលទាំងពីរដូស (MMR)
- ✓ បុរសិលបីអុនកមិនកូនហានចាក់នាក់សាំងទាំងពីរដូស ឬអុនកមិនចុហាស់ ចាតីអុនកហានចាក់នាក់សាំងឬអក់ ពី៨ ទៅ ៦សប្តាហ៍មុនពេល ចេញ ដំណើរ សូមទាសុចា បិទរដេចសាសុនុម និមទទួលការចាក់នាក់សាំង ចំនួន ២ដូសរៀងរាល់ ៨សប្តាហ៍។



ព្រលកំពុងចុះដំណើរការកំសានុក

- ✓ នាកនុលងែងវៃមានមនុសុសចុនិទ សូមអនុនកុកតាមចុហាប់អនាមិយ ចុទាល់ខុលួន ដូចចាកាកំម៉ាស់ លាងដៃ និមមានសុដីនចម៍កុនុមពលកុអក។



ពលចូលបុនទសកុនី

- បុនសិទបីបុនសុហានគុនគុន បុនសិទគុនគុនគុនគុន នៅពេលបុនសុនុនី



**សូមទៅកាន់សុចារិបនរេជេជសាសុត្តដាយពាក់ម៉ាស និងកាក់បន្ទុចេឃ
ការប៉ះពាល់ជាមួយអុនកដទី**

(ហាមបុនីបុនាសំមចុឃាហឃចុនីដំណើរចាសាចារណៈ)



ចូនដំណើរដល់បុតុកលិកពាទេឃអំពី "បុនុតុកិការចុនីដំណើរទៅកុនាបុនុទេស"



+ ដំណើរការចាក់ចុះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ចុះរីលកាមអាយុ +

មុនចុះវ៉ាក់សាំងកំណត់	វិធីសាស្ត្រការចាក់វ៉ាក់សាំង
៥-៥ខែ កុរាវកីត	មិនមែនជាអ្នកកង់កែលកុរាវចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។
៦-១១ខែ កុរាវកីត (បង្កើន លុបបាត់ការចាក់វ៉ាក់សាំង*) * ចៀសមិនចូលពេលវេជ្ជសាស្ត្រ វិភាគចាក់ចុះវ៉ាក់សាំងស្របដូចមិនកុរាវ បាត់បង់ពេញអាចអនុវត្តបាន បាត់ ពេលវេជ្ជសាស្ត្រកុរាវកីតមិនមែនទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតចាប់ផ្តើម។	ការចាក់វ៉ាក់សាំង១ដូស ពេលចុះវ៉ាក់សាំងកុរាវបុរាណ * ការចាក់វ៉ាក់សាំង MMR មុនអាយុ១២ខែ កុរាវកីត វាមិនកុរាវបាត់ រាប់បញ្ចូលក្នុងចំនួនការចាក់វ៉ាក់សាំងទេ ដូចនេះការចាក់វ៉ាក់សាំង២ដូស កុរាវបាត់ទាមទារ ដើម្បីបំពេញតាមការវិភាគចាក់វ៉ាក់សាំងស្របដូចមិនកុរាវពេញអាចអនុវត្ត។
១២-១៥ខែ កុរាវកីត (ការចាក់វ៉ាក់សាំងទាន់ពេលវេលា)	ការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី១
៨-៦ខែ (ការចាក់វ៉ាក់សាំងទាន់ពេលវេលា)	ការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី២
យុវជន មិនមែនស្រីពេញវ័យ*	※ ករណីកុមារភក្តីក្នុងតារាងវ៉ាក់សាំង ការចាក់ចុះវ៉ាក់សាំង២ដូស(វ៉ាក់សាំង១ដូស) នៅចន្លោះពេលក៏ចំបំប្រុងប្រយោជន៍សុខភាពឡើយ។

* ករណីអ្នកកើតមុនថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៦៨ អ្នកកុរាវបាត់ ចាក់ទុកជាមាត ភាពស្រស់ស្អាតក៏កំណត់ចំពោះជំងឺកញ្ចុះរីលដូចនេះអ្នកមិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។

※ ករណីកុមារភក្តីក្នុងតារាងវ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ចុះរីល

**សូមពិនិត្យធុហាងបង្កការជំងឺកញ្ញាជំងឺ
មុននឹងជំងឺណាវីនកំសាន្តករ នៅប្រទេស
ឌុយមានភាពរីករាយក្នុងការជំងឺណាវីនកំសាន្តករ!**

