

ຫຼຸດໄລຍະຫ່າງຂອງການກະຕຸ້ນ ແລະແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ຟາຍເຊີ້ ກັບຜູ້ທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 30 ປີ

- ຫຼຸດໄລຍະຫ່າງການສັກວັກຊີນ ເພື່ອເພີ່ມການກະຕຸ້ນ (ການສັກຢາ ວັກຊີນກະຕຸ້ນ) ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ	ແນະນຳໄລຍະຫ່າງຂອງການສັກວັກຊີນ	
	ປະຈຸບັນ	ການປ່ຽນແປງ
60ປີ ຂຶ້ນໄປ ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ¹⁾ ພະຍາບານໃນໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າ ການເຂົ້າ ພະນັກງານປະຈຳສະຖານທີ່ ຄົນເຈັບທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບທາງ ການແພດ (ອາຍຸ 18- 59 ປີ) ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການແພດເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍແລະຄລິນິກ	6ເດືອນ	4ເດືອນ
50ປີ ກຸ່ມອາຊີບ ທີ່ໄດ້ບຸລິມະສິດໃນການສັກຢາ ²⁾	6ເດືອນ	5ເດືອນ
ຢາວັກຊີນ ແຈນເຊັນ ພູມຕ້ານທານອ່ອນແອ ³⁾	2ເດືອນ	2ເດືອນ (ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ)

- ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ (ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຕອນເວັນ / ກາງຄືນ / ການດູແລໄລຍະສັ້ນ), ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສຳລັບຄົນພິການ (ທີ່ຢູ່ອາໄສ / ການດູແລປະຈຳວັນ), ສະຖານທີ່ດູແລຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີສຸຂະພາບຊຸບໂຊມ, ສະຖານທີ່ດຳລົງຊີວິດສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກ ແລະ ພວກພະຍາດຂີ້ຫູດ, ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ນຳໃຊ້.
- ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກດັບເພີງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຝັ່ງທະເລ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແພດພິ, ພະຍາບານພິເສດສຳລັບເດັກ ແລະ ພະຍາບານດູແລປະຈຳວັນ, ຄູສອນພິເສດດ້ານການສຶກສາແລະ ສຸຂະພາບ, ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ, ແລະອື່ນໆ, ພະນັກງານການບິນ, ແລະອື່ນໆ.
- ໂຮງມະເຮັງເມັດເລືອກຂາວ, ການປິ່ນປົວພູມຄຸ້ມກັນ, ແລະອື່ນໆ.
 - ສາມາດນັດຈອງໄດ້ໃນເວັບໄຊການຈອງວັກຊີນ Corona 19 ລ່ວງໜ້າ (<https://ncvr.kdca.go.kr>) ລ່ວງໜ້າ 2 ອາທິດກ່ອນວັນເວລາສັກຢາ (ຫຼັງຈາກ 11.22 (ວັນຈັນ))
 - * ມີສັກຢາສາມາດເລືອກໄດ້ຫຼັງຈາກ ວັນທີ6 ເດືອນທັນວາ (ວັນຈັນ)
 - ເມື່ອຮອດວັນເວລາທີ່ຈອງ, ການມີສິດໄດ້ຮັບແລະວິທີການຈອງຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ ເປັນລາຍບຸກຄົນໂດຍຜ່ານຂໍ້ຄວາມ.
 - ແນະນຳໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນ ຟາຍເຊີ້ ສຳລັບວັກຊີນຂັ້ນຕົ້ນ (ຄັ້ງທີ 1 ແລະ 2) ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 30 ປີ (ຜູ້ທີ່ເກີດຫຼັງຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 1992)
 - ໃນບາງປະເທດ, ອັດຕາການເກີດມີຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈ ແລະເຍື້ອຫຸ້ມຫົວໃຈ ແມ່ນວັກຊີນ ຊະນິດ ໂມເດີນນ່າ ມີອັດຕາສູງກວ່າວັກຊີນ ໄຟເຊີ, ສະນັ້ນມາດຕະການປ້ອງກັນໄດ້ຖືກນຳມາປະຕິບັດ.
 - ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ Corona 19 ແມ່ນອີງຕາມການພື້ນຕົວເທື່ອລະກ້າວຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ
 - ມາດຕະການເຊັ່ນ: ໄລຍະການພື້ນຟູປະຈຳວັນຫຼືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນສຸກເສີນຕາມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານສຳລັບຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງທາງການ ແພດ.
 - ການປະເມີນຜົນປະຈຳອາທິດແລະການຕັດສິນໃຈວ່າຈະປະຕິບັດການພື້ນຟູປະຈຳວັນຫຼັງຈາກ 4 ອາທິດຂອງຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ.