


Vì sự an toàn khi tiêm chủng phòng ngừa Covid-19

**Hãy ghi nhớ**  
những điều lưu ý về các dấu  
hiệu bất thường  
sau khi tiêm phòng!



# Sau khi tiêm phòng, hãy thực hiện như sau :



Trong trường hợp vị trí tiêm sưng, đau,  
hãy đắp một khăn sạch,  
khô lên và **chườm lạnh** vị trí đó.



Trong trường hợp sốt nhẹ,  
hãy **uống đủ nước** và nghỉ ngơi.



Trong trường hợp sốt cao hoặc đau cơ, khó chịu,  
**uống thuốc hạ sốt - giảm đau** sẽ giúp giảm được  
các triệu chứng trên.

\* Trước khi tiêm phòng, nên chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt - giảm đau có thành phần acetaminophen,  
sau khi tiêm phòng, nếu cơ thể có triệu chứng đau và mệt mỏi, hãy uống thuốc hạ sốt - giảm đau.

# Hãy liên hệ với bác sĩ để điều trị trong các trường hợp sau đây :

## Sau khi tiêm phòng

- Sau khi tiêm phòng, sau 48 giờ **vị trí tiêm sưng, đau**, mẩn đỏ trở nên nghiêm trọng hơn
- Sau khi tiêm phòng và trong thời gian 4 tuần, xuất hiện **các triệu chứng như khó thở, đau thắt lồng ngực, đau bụng liên tục, phù chân**
- Sau khi tiêm phòng, xuất hiện triệu chứng đau đầu nghiêm trọng hoặc liên tục 2 ngày trở lên, **không thấy hiệu quả hay suy giảm từ thuốc giảm đau, hoặc có trường hợp mờ mắt**
- Sau khi tiêm phòng, **đột ngột cảm thấy không có sức lực hoặc xuất hiện các triệu chứng khác thường**
- Sau khi tiêm phòng, xuất hiện **vết bầm hoặc ra máu** ở những vị trí không phải vị trí tiêm



# Hãy gọi 119 hoặc đến phòng cấp cứu trong các trường hợp sau đây :

- Sau khi tiêm phòng, cảm thấy **khó thở** hoặc **chóng mặt** nhiều
- Sau khi tiêm phòng, **sưng môi, mặt** hoặc **nổi mề đay** khắp người
- Sau khi tiêm phòng, đột ngột **mất ý thức** hoặc **ngất xỉu**

