

Сокращение интервала между второй и бустерной дозами вакцины.

Лицам до 30 лет рекомендуется препарат Pfizer

- Принимая во внимание риски в связи с тяжелыми смертельными случаями, решено сократить интервал по ревакцинации (бустерная доза)

Показания	Рекомендуемый интервал вакцинации	
	Действующий	Изменение
Лица старше 60 лет	6 месяцев	4 месяца
Работники и постояльцы учреждений, уязвимых для инфекции ¹⁾		
Работники и постояльцы больниц и домов для престарелых		
Лица с сопутствующими заболеваниями (18-59 лет)		
Работники больниц, клиник и других медицинских учреждений		
Лица от 50-ти лет	6 месяцев	5 месяцев
Определённая группа работников, подлежащая вакцинации в первую очередь ²⁾		
Вакцинированные вакциной Janssen	2 месяца	2 месяца (Изменений нет)
Лица с пониженным иммунитетом ³⁾		

- 1) Учреждения для престарелых (проживание, дневная/ночная/краткосрочная опека), учреждения для инвалидов (проживание/дневная опека), дома для престарелых, жилые помещения для больных туберкулёзом, лепрозории, жилые комплексы и учреждения для бездомных
 - 2) Военнослужащие, полицейские, пожарные, сотрудники морской полиции, персонал здравоохранения и медицинского обслуживания, специальный персонал по уходу за детьми и медперсонал в детских садах, преподаватели специального образования и здравоохранения, работники исправительных учреждений и т.д., авиаработники и др.
 - 3) Больные острым лейкозом, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию и др.
- Вышеперечисленные лица, предварительно за 2 недели до соответствующего периода вакцинации, могут записаться

на сайте предварительной записи на прививку от коронавируса «Нуричип» (<https://ncvr.kdca.go.kr>). Запись начинается с 22 ноября.

* Дату вакцинации можно выбрать после 6 декабря (пн.)

○ Как только наступит период записи, будут отправлены **SMS-сообщения о кандидатах на вакцинацию и способе предварительной записи**

Лицам младше 30 лет (рождённые после 01.01.1992г.), при первоначальной (1-ой и 2-ой) вакцинации рекомендуется препарат Pfizer

○ В некоторых странах развитие миокардита и перикардита после вакцины Moderna выше, чем после вакцины Pfizer, в связи с этим и принимаются такие превентивные меры

Оценка степени риска COVID-19 в соответствии с поэтапным восстановлением к повседневной жизни

○ Введение таких мер, как поэтапное возвращение к повседневной жизни или приведение в действие программы при чрезвычайных ситуациях в соответствии с общей оценкой степени рисков по различным показателям, с упором на возможности медицинского реагирования.

○ Решения о переходе к повседневной жизни будут приниматься после еженедельной и общей поэтапной оценки после каждых 4-х недель.

<Данный перевод предоставлен колл-центром Данури 1577-1366>