

ลดระยะเวลาห่างของการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม

และแนะนำให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในผู้ที่อายุต่ำกว่า30ปี

- ลดระยะเวลาฉีดวัคซีนกระตุ้น ให้สั้นลง (บูสเตอร์ช็อต)
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย	แนะนำช่วงระยะเวลาการฉีดวัคซีน	
	ปัจจุบัน	เปลี่ยนแปลง
อายุ 60ปีขึ้นไป	6เดือน	4เดือน
การรับคนงาน เข้าทำงานในสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ ¹⁾		
ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษา บุคลากร ในโรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ สถานอำนวยความสะดวก		
ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว (อายุ18-59ปี)		
บุคลากร สถาบันทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลและคลินิก ฯลฯ	6เดือน	5เดือน
วัย50		
กลุ่มอาชีพที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่ ่อน ²⁾	2เดือน	2เดือน (ไม่เปลี่ยนแปลง)
ผู้ที่ฉีดวัคซีนจอห์นสัน		
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ³⁾		

- 1) สถานอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ(ที่เข้ารับการดูแลระยะสั้น กลางวัน/กลางคืน)
สถานอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ที่เข้าพักอาศัย รับการดูแล /
กลางวัน) ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พักอาศัยร่วมกัน,สถานอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยโรค /
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง),ที่อยู่อาศัยและใช้สถานที่ร่วมกัน
- 2)บุคลากรทางทหาร,ตำรวจ, ดับเพลิง,หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล,บุคลากรทางการแพทย์ ,
เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กพิเศษ,ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก,ครูสอนพิเศษและสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์,พนั
กงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฯลฯ
- 3) ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรค เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถจองการฉีดวัคซีนโคโรนา ตั้งแต่ 2สัปดาห์ก่อน
สามารถจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า ได้ที่โฮมเพจ นูริจีบ (<https://hcvr.kdca.go.kr>) (หลัง เวลา
22. วันที่11(จันทร์)เป็นต้นไป

* หลัง วันที่ 6 (จันทร์) ธันวาคม เป็นต้นไปสามารถเลือกวันฉีดวัคซีนได้

เนื่องจากบางประเทศเกิดการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากการฉีด
วัคซีนโมเดอร์นาสูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ดังนั้นจึงมีมาตรการเพื่อป้องกันไว้ก่อน

ในเวลาทำการจอง ผู้มีคุณสมบัติ และวิธีการจอง จะแจ้งให้ทราบ เป็นรายบุคคล ทางข้อความ

- ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30ปี (เกิดหลัง 1.1. 92.) ฉีดวัคซีนพื้นฐาน (ครั้งที่1 และ2)

แนะนำให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ตามลำดับขั้นตอนการกลับไปใช้ชีวิตปกติ

มาตรการต่างๆการประเมินความหลากหลายของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงครอบคลุมโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการตอบสนองทางการแพทย์ เช่นระดับขั้นตอนของการดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน ในการกลับไปใช้ชีวิตปกติ

ประเมินทุกสัปดาห์ หลัง4สัปดาห์ ตัดสินว่าจะมาตรการเพื่อกลับสู่การใช้ชีวิตปกติได้หรือไม่

<แปลโดยศูนย์โทรศัพท์ทนาย1577-1366>